



MARS 2011

# LANAUDIÈRE ET SES RLS

Un aperçu des indicateurs de l'Enquête  
québécoise sur la santé de la population, 2008

Service de surveillance, recherche et évaluation  
DSPE de Lanaudière



# LANAUDIÈRE ET SES RLS

Un aperçu des indicateurs de l'Enquête  
québécoise sur la santé de la population, 2008

### Conception et traitement des données

Geneviève Marquis  
Josée Payette  
Techniciennes en recherche psychosociale

### Comité de lecture

Christine Garand  
Abdoul Aziz Gbaya  
André Guillemette  
Louise Lemire  
Marie-Eve Simoneau

### Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

### Conception graphique

Micheline Clermont  
Josée Payette

### Mise en page

Micheline Clermont  
Sylvie Harvey

La version PDF de ce document est disponible sur le site Web de l'Agence au : [www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA) sous l'onglet *Nos publications*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève, et Josée PAYETTE. *Lanaudière et ses RLS. Un aperçu des indicateurs de l'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 2011, 109 pages.

Dépôt légal  
Premier trimestre 2011  
ISBN : 978-2-89669-048-0 (version imprimée)  
978-2-89669-049-7 (version PDF)  
Bibliothèque et Archives du Canada  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

# TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS .....	7
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION .....	14
COMMENT LIRE LES DONNÉES .....	19
▶ BLESSURES ET TROUBLES MUSCULOQUELETTIQUES	
Blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois .....	22
Blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois .....	24
Troubles musculoquelettiques au cours des 12 derniers mois .....	26
Troubles musculoquelettiques liés au travail actuel ou antérieur au cours des 12 derniers mois .....	27
▶ COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES	
Test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans .....	30
Test de Pap au cours d'une période de moins d'un an .....	31
Contraception hormonale combinée .....	32
Contraception hormonale combinée chez les femmes qui fument la cigarette .....	33
▶ COMPORTEMENTS SEXUELS ET USAGE DE LA CONTRACEPTION	
Population active sexuellement au cours des 12 derniers mois .....	36
Femmes actives sexuellement ayant utilisé un moyen contraceptif au cours des 12 derniers mois .....	38
▶ Usage du condom comme moyen contraceptif .....	39
▶ Usage de la pilule comme moyen contraceptif .....	40
Diagnostic d'infection transmise sexuellement .....	41
Hommes actifs sexuellement ayant utilisé un moyen contraceptif au cours des 12 derniers mois .....	42
▶ Usage du condom comme moyen contraceptif .....	44
▶ Usage de la pilule comme moyen contraceptif .....	46
Population ayant toujours utilisé le condom au cours des 12 derniers mois .....	48
▶ CONSOMMATION DE DROGUES	
Consommation de drogues au cours de la vie .....	52
Consommation de cannabis au cours de la vie .....	54
Consommation de cocaïne au cours de la vie .....	56
Consommation d'amphétamines au cours de la vie .....	58
Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois .....	60
<i>Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois .....</i>	<i>62</i>

▶ <b>ÉTAT DE SANTÉ</b>	
Perception négative de son état de santé -----	66
▶ <b>SITUATION FINANCIÈRE</b>	
Perception négative de sa situation financière -----	70
▶ <b>TENSION ARTÉRIELLE</b>	
Prise de la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin -----	74
Prise de la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année -----	75
▶ <b>RHINITE ALLERGIQUE ET HERBE À POUX</b>	
Diagnostic de rhinite allergique -----	78
Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic -----	80
Diagnostic d'allergie à l'herbe à poux -----	82
▶ <b>SANTÉ BUCCODENTAIRE</b>	
Perception de sa santé buccodentaire -----	86
Édentation -----	88
Brossage de dents ou de prothèses dentaires -----	90
Utilisation de la soie dentaire -----	92
▶ <b>SANTÉ MENTALE</b>	
Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale -----	96
Niveau élevé de détresse psychologique -----	98
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie -----	100
Tentative de suicide au cours de la vie -----	101
▶ <b>STATUT PONDÉRAL</b>	
Perception d'un excès de poids -----	104
Tentative de perdre du poids -----	106
Surplus de poids -----	108
<b>RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES</b> -----	109



## AVANT-PROPOS

Les enquêtes sociosanitaires constituent une source d'information complémentaire aux données fournies par les banques de données administratives. Elles contribuent à éclairer la prise de décision liée au processus de planification et permettent d'apprécier l'état de santé de la population et des déterminants qui lui sont associés. À bien des égards, elles sont même les seules sources disponibles.

### Mise en contexte

En 2008, dix ans se sont écoulés depuis la parution des trois enquêtes sur la santé et le bien-être des Québécois réalisées par Santé Québec (*l'Enquête Santé Québec 1987*, *l'Enquête sociale et de santé 1992-1993* et *l'Enquête sociale et de santé 1998*). L'Institut de la statistique du Québec (ISQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) renoue avec les enquêtes générales de santé en lançant la première édition d'une nouvelle enquête : *l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008*.

L'EQSP 2008 s'inscrit parmi une « nouvelle génération d'enquêtes planifiées à des fins de surveillance » (Traoré, Camirand et Baulne, 2010, p. 3) au *Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé - volet État de santé* élaboré en 2006 pour répondre aux besoins d'information du MSSS et du réseau de la santé et des services sociaux. En complément à d'autres enquêtes, notamment *l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)* de Statistique Canada, l'EQSP 2008 est une enquête transversale à portée régionale. Elle devrait être reprise à tous les cinq ans.

## Objectifs de l'enquête et thèmes étudiés

L'objectif général de l'EQSP 2008 est de dresser un portrait de santé de la population par la collecte, l'analyse et l'interprétation de données, avec une représentativité régionale. Il s'agit de :

- ▶ combler certains besoins d'information prioritaire à l'échelle du Québec et de ses régions sur l'état de santé de la population et ses déterminants, dont la meilleure source est l'enquête;
- ▶ suivre l'évolution temporelle, au sein de la population, de certains problèmes spécifiques de santé et leurs déterminants (en assurant la récurrence de l'enquête);
- ▶ informer la population sur son état de santé.

Plus spécifiquement, l'enquête vise à :

- ▶ recueillir de l'information sur les indicateurs non couverts ou mal documentés au niveau régional par les sources de données existantes. Le contenu du questionnaire aborde les grandes thématiques suivantes :
  - ▶ profil sociodémographique (15 questions)
  - ▶ santé générale et allergies (16)
  - ▶ poids et perception de son apparence physique (33)
  - ▶ hygiène et santé buccodentaire (5)
  - ▶ blessures (16)
  - ▶ santé au travail (29)
  - ▶ troubles musculosquelettiques (13)
  - ▶ bien-être et santé mentale (7)
  - ▶ tendances suicidaires (6)
  - ▶ habitudes de vie (tabac, drogues, sexualité) (36)
  - ▶ développement socio-émotionnel des enfants de 3 à 14 ans (34).

## Aspects méthodologiques... en bref

### Population cible

La population visée par l'EQSP 2008 est composée de l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé au Québec<sup>1</sup>. N'en font pas partie les personnes vivant dans un ménage collectif (ex. : centre hospitalier, CHSLD, maison de retraités, pénitencier) et les personnes vivant dans une réserve amérindienne. L'enquête couvre 16 des 18 régions sociosanitaires (RSS) du Québec<sup>2</sup>.

La collecte de données s'est déroulée du 13 février 2008 au 15 mars 2009. Au terme de celle-ci, 38 154 entrevues ont été réalisées, réparties en cinq périodes de collecte, pour tenir compte d'éventuelles variations saisonnières.

### Taux de réponse

Le nombre de répondants attendus par l'EQSP 2008 a été fixé à 2 011 pour chaque région sociosanitaire couverte par l'enquête. La taille de l'échantillon et sa répartition ont été fixées de façon à fournir des estimations fiables et précises.

Bien que le taux de réponse obtenu pour l'ensemble du Québec (58 %) soit un peu inférieur à ce qui était attendu, le taux visé par région (un minimum de 60 %, tout en espérant 65 %) est atteint pour la grande majorité de celle-ci. Les taux régionaux oscillent entre 60 % et 67 %, à l'exception des régions de Montréal et de Laval ayant obtenu des taux de 47 % et de 54 %. Quant à celui de Lanaudière, il est de 63 %.

---

<sup>1</sup> Dans le cas où le répondant est le parent d'au moins un enfant de 3 à 14 ans habitant dans le ménage, une sélection aléatoire d'un de ses enfants a été effectuée afin que le parent réponde à des questions sur le développement psychosocial de son enfant. Pour toute information sur les aspects méthodologiques, le lecteur est invité à consulter le chapitre *Aspects méthodologiques* du rapport de l'enquête (Camirand et autres, 2010).

<sup>2</sup> Les régions 17 (Nunavik) et 18 (Terres-Cries-de-la-Baie-James) ont été exclues.

## *À propos de la représentativité de Lanaudière... une première*

Compte tenu de certains besoins régionaux, l'ISQ et le MSSS ont offert aux directions régionales de santé publique l'opportunité d'acheter des unités d'échantillons additionnelles afin de permettre l'obtention d'estimations fiables à l'échelle des réseaux locaux de services (RLS).

La Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de Lanaudière s'est prévaluée de cette possibilité. La répartition prévue de l'échantillon régional permettait d'emblée l'atteinte des objectifs de précision infrarégionaux en raison du nombre de RLS dans la région, soit deux. Il a alors été demandé à l'ISQ que la méthodologie développée pour la région assure la production d'estimations fiables à l'échelle locale<sup>3</sup>.

## *Présentation de données à l'échelle locale*

Ce document, sous forme de recueil statistique, expose les premiers résultats de l'EQSP 2008 pour la région de Lanaudière mettant en évidence les deux territoires de RLS. Il a été conçu afin de produire des informations locales fiables sur l'état de santé des Lanaudoises et des Lanaudois et ses déterminants. Il vise à donner un aperçu des résultats et à illustrer le potentiel d'analyse des données de cette enquête. Au cours des prochains mois, des rapports proposant des analyses descriptives sur certaines problématiques seront produits.

Le présent document ne couvre pas toutes les thématiques de l'enquête. Douze thèmes sont présentés. Sauf indication contraire, la majorité des indicateurs liés à ces derniers concernent la population de 15 ans et plus. Ils ont été croisés selon le sexe et l'âge et sont présentés par territoire de RLS, pour Lanaudière et le reste du Québec. Pour en savoir davantage sur chaque indicateur, le lecteur est invité à consulter le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA) sur le site Web de l'Agence au : [www.agencelanaudiere.qc.ca/Sylia](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/Sylia) sous l'onglet Statistiques. Il y trouvera une fiche qui présente une description détaillée de chaque indicateur.

---

<sup>3</sup> Le nombre de répondants est de 1 094 pour le RLS de Lanaudière-Nord et de 976 pour le RLS de Lanaudière-Sud pour des taux de réponse de 64 % et de 62 % respectivement.

## *Utilité de l'outil*

Nous souhaitons que les données présentées puissent soutenir les gestionnaires et les intervenants dans leur responsabilité populationnelle. Grâce aux informations contenues dans ce document, ils pourront être mieux informés sur l'état de santé de leur population, cibler les phénomènes préoccupants ou en émergence, et finalement, mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent la santé de leur population.

Finalement, nous espérons vivement que les données de l'EQSP 2008 contribueront à soutenir la mise en œuvre des plans d'action en santé publique, tant à l'échelle régionale que locale.



CARACTÉRISTIQUES  
DE LA POPULATION

## Caractéristiques de la population

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Sexe</b>				
Hommes	82 000	50,6	102 300	49,8
Femmes	80 100	49,4	103 100	50,2
<b>Groupe d'âge</b>				
15-24 ans	23 200	14,3	35 300	17,2
25-44 ans	48 000	29,6	72 500	35,3
45-64 ans	62 400	38,5	73 600	35,9
65 ans et plus	28 500	17,6	24 000	11,7
<b>Niveau de scolarité</b>				
Inférieur au diplôme d'études secondaires	54 100	33,9	50 500	25,0
Diplôme d'études secondaires	49 100	30,8	56 500	28,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	34 900	21,9	55 200	27,3
Diplôme d'études universitaires	21 500	13,4	39 900	19,7
<b>Composition du ménage</b>				
Personne seule	19 600	12,4	14 200	7,2
Couple sans enfant	51 800	32,9	49 200	25,0
Couple avec enfants	63 200	40,2	108 400	55,2
Famille monoparentale	11 400	7,2	15 700	8,0
Autre	11 600	7,3	8 900	4,5
<b>Occupation principale</b>				
Travailleurs	95 000	59,2	131 000	64,4
Étudiants	15 800	9,8	25 600	12,6
Personnes sans emploi	13 300	8,3	15 200	7,4
Retraités	36 400	22,7	31 700	15,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>				
Quintile 1 (niveau inférieur)	26 700	17,3	30 500	15,6
Quintile 2	28 800	18,7	40 900	21,0
Quintile 3	35 700	23,2	36 800	18,9
Quintile 4	29 500	19,1	52 400	26,9
Quintile 5 (niveau supérieur)	33 500	21,7	34 400	17,7

1 : Population estimée arrondie à la centaine.

2 : Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : © Gouvernement du Québec, 2010, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008.

# Caractéristiques de la population

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Sexe</b>				
Hommes	184 200	50,1	2 942 100	49,4
Femmes	183 100	49,9	3 017 200	50,6
<b>Groupe d'âge</b>				
15-24 ans	58 500	15,9	915 300	15,4
25-44 ans	120 500	32,8	1 988 000	33,4
45-64 ans	136 000	37,0	2 087 800	35,0
65 ans et plus	52 500	14,3	968 200	16,2
<b>Niveau de scolarité</b>				
Inférieur au diplôme d'études secondaires	104 600	28,9	1 445 900	24,5
Diplôme d'études secondaires	105 600	29,2	1 476 500	25,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	90 000	24,9	1 537 600	26,1
Diplôme d'études universitaires	61 300	17,0	1 432 100	24,3
<b>Composition du ménage</b>				
Personne seule	33 700	9,5	788 900	13,6
Couple sans enfant	100 900	28,5	1 662 400	28,7
Couple avec enfants	171 600	48,5	2 454 200	42,4
Famille monoparentale	27 100	7,6	495 500	8,6
Autre	20 400	5,8	392 700	6,8
<b>Occupation principale</b>				
Travailleurs	225 900	62,1	3 540 300	60,1
Étudiants	41 400	11,4	779 000	13,2
Personnes sans emploi	28 500	7,8	419 300	7,1
Retraités	68 100	18,7	1 156 200	19,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>				
Quintile 1 (niveau inférieur)	57 100	16,4	1 101 400	19,5
Quintile 2	69 700	20,0	1 174 500	20,8
Quintile 3	72 400	20,8	1 101 500	19,5
Quintile 4	81 800	23,5	1 146 100	20,3
Quintile 5 (niveau supérieur)	67 800	19,4	1 135 500	20,1

1 : Population estimée arrondie à la centaine.



2 : Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : © Gouvernement du Québec, 2010, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008.



COMMENT LIRE  
LES DONNÉES








BLESSURES  
ET TROUBLES  
MUSCULOSQUELETTIQUES

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	18 900	11,7	24 100	11,5
Hommes	9 500	11,7	12 200	11,9 *
Femmes	9 400	11,7	11 900	11,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	1 900	8,1 **	4 200	11,8 **
25-44 ans	7 200	14,9 *	7 500	10,4 *
45-64 ans	7 800	12,5	10 900	14,8
65 ans et plus	2 000	7,0 *	1 500	6,2 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	43 000	11,5	705 200	11,8
Hommes	21 700	11,6	354 800	11,9
Femmes	21 300	11,5	350 400	11,7
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	6 000	10,3 *	92 700	10,1
25-44 ans	14 700	12,2	274 100	13,8
45-64 ans	18 700	13,8	291 800	14,0
65 ans et plus	3 500	6,7 *	46 500	4,8

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	21 500	13,5	23 500	11,2
Hommes	14 300	17,8	13 300	12,2
Femmes	7 200	9,1 *	10 200	9,9
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	5 700	24,4 *	8 400	23,8 *
25-44 ans	6 600	13,8 *	5 700	7,9 *
45-64 ans	7 100	11,4 *	7 000	9,5 *
65 ans et plus	2 100	7,3 **	2 400	10,1 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	45 000	12,1	653 500	11,0
Hommes	27 600	14,6	375 600	12,6
Femmes	17 400	9,5	277 900	9,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	14 100	24,1	156 400	17,1
25-44 ans	12 400	10,3	242 500	12,2
45-64 ans	14 100	10,3	192 400	9,2
65 ans et plus	4 500	8,6 *	62 100	6,4

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	51 600	31,8	64 100	31,2
Hommes	23 200	28,3	28 500	27,9
Femmes	28 400	35,5	35 600	34,6
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	3 900	17,0 *	8 600	24,5 *
25-44 ans	15 700	32,7	19 400	26,7
45-64 ans	22 300	35,7	28 200	38,3
65 ans et plus	9 700	33,9	7 900	33,0

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	115 700	31,5	1 803 000	30,3
Hommes	51 600	28,0	740 800	25,2
Femmes	64 000	35,0	1 062 100	35,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	12 600	21,5	204 700	22,4
25-44 ans	35 100	29,1	554 800	27,9
45-64 ans	50 500	37,1	725 600	34,8
65 ans et plus	17 600	33,5	318 700	32,9

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques liés au travail actuel ou antérieur à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	32 000	19,2	41 200	19,8
Hommes	15 900	18,5	20 200	19,4
Femmes	16 200	19,9	21 000	20,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	1 800	7,9 **	5 100	14,4 *
25-44 ans	10 700	22,1	15 800	21,8
45-64 ans	15 900	24,6	17 900	24,1
65 ans et plus	3 500	11,8 *	2 000	7,7 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques liés au travail actuel ou antérieur à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	73 200	19,5	1 085 700	17,7
Hommes	36 100	19,0	480 000	15,8
Femmes	37 200	20,0	605 800	19,6
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	6 900	11,8 *	108 300	11,8
25-44 ans	26 400	21,9	394 300	19,5
45-64 ans	33 800	24,3	487 100	22,7
65 ans et plus	5 600	9,9 *	90 200	8,8

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



COMPORTEMENTS  
DE SANTÉ  
PROPRES AUX FEMMES

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)


	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	46 800	69,3	66 700	76,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
18-24 ans	3 200	43,2 *	5 600	61,8
25-44 ans	19 100	81,6	31 800	87,1
45-69 ans	24 400	66,9	29 300	69,4


Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	113 500	73,1	1 826 600	73,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
18-24 ans	8 800	53,2	179 800	63,1
25-44 ans	50 900	85,0	802 500	82,4
45-69 ans	53 700	68,3	843 500	68,4

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins d'un an selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	34 000	50,4	44 000	50,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
18-24 ans	3 100	41,3 *	4 600	50,9 *
25-44 ans	14 800	63,0	22 200	60,9
45-69 ans	16 100	44,2	17 200	40,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins d'un an selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	77 900	50,2	1 229 100	49,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
18-24 ans	7 700	46,5	141 600	49,7
25-44 ans	37 000	61,7	551 800	56,6
45-69 ans	33 300	42,3	535 000	43,4

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)


	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	9 000	25,0	17 100	29,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	4 600	61,6	8 400	68,6
25-49 ans	4 300	15,2 *	8 700	18,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	26 100	27,5	442 400	30,6
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	13 000	65,9	205 700	66,9
25-49 ans	13 100	17,3	235 900	20,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre groupe d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée et qui fument la cigarette selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	2 600	28,8 *	3 300	19,0 **
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-49 ans	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée et qui fument la cigarette selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	5 900	22,4 *	104 000	23,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	3 800	29,3 *	56 400	27,4
25-49 ans	2 000	15,5 **	47 400	20,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.


Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



COMPORTEMENTS  
SEXUELS ET USAGE  
DE LA CONTRACEPTION

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	128 000	78,9	169 900	80,4
Hommes	67 900	82,4	86 400	83,1
Femmes	60 100	75,4	83 500	78,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	15 500	66,7	24 700	70,1
25-44 ans	45 600	95,1	69 200	95,5
45-64 ans	52 000	83,3	64 500	87,7
65 ans et plus	14 000	49,0	10 800	45,2

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	297 900	79,8	4 644 600	77,4
Hommes	154 300	82,6	2 441 200	82,1
Femmes	143 700	77,2	2 204 200	73,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	40 100	68,7	613 100	67,0
25-44 ans	114 800	95,3	1 854 600	93,3
45-64 ans	116 500	85,7	1 721 900	82,5
65 ans et plus	24 800	47,2	427 400	44,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec, en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	23 200	64,3	40 400	68,4
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-34 ans	np	np	np	np
35-49 ans	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	63 600	66,9	964 400	66,6
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	17 900	90,5	277 100	89,9
25-34 ans	19 600	74,3	313 800	70,8
35-49 ans	26 100	53,2	373 000	53,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	7 100	19,8	12 300	21,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	3 200	41,9 *	6 400	52,6
25-34 ans	2 200	21,7 *	3 500	21,3 **
35-49 ans	1 800	9,7 **	2 400	8,0 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	19 400	20,6	329 000	22,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	9 600	48,5	130 200	42,3
25-34 ans	5 600	21,4 *	99 500	22,5
35-49 ans	4 200	8,7 *	99 000	14,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	8 900	24,6	16 500	28,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	4 500	59,9	8 000	65,2
25-34 ans	3 600	35,8 *	6 600	40,4 *
35-49 ans	800	4,1 **	1 900	6,3 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	25 400	26,8	432 300	30,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	12 500	63,2	202 000	65,6
25-34 ans	10 200	38,7	162 700	36,9
35-49 ans	2 700	5,5 *	67 300	9,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) qui a eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	9 500	6,1	15 300	7,9
Hommes	4 400	5,6 *	7 600	8,0 *
Femmes	5 100	6,7 *	7 600	7,7 *
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) qui a eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	24 800	7,1	464 200	8,2
Hommes	12 000	6,9	198 000	7,1
Femmes	12 800	7,3	266 100	9,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	1 700	4,0 **	33 400	5,0
25-44 ans	14 800	12,5	219 700	11,2
45-64 ans	7 200	5,3 *	181 000	8,8
65 ans et plus	700	1,3 **	26 000	2,8

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	30 900	45,7	43 000	46,8
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-34 ans	np	np	np	np
35-44 ans	np	np	np	np
45 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	73 900	46,2	1 142 900	45,9
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	18 400	91,1	259 500	87,7
25-34 ans	16 200	62,4	312 000	69,1
35-44 ans	16 500	53,1	270 400	56,7
45 ans et plus	22 700	29,7	290 700	25,0

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	9 400	14,7	13 500	16,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	2 900	37,3 **	6 700	54,1 *
25-34 ans	2 200	20,6 **	2 500	16,7 **
35-44 ans	2 000	16,1 **	2 500	13,8 **
45 ans et plus	2 300	6,6 **	2 100	5,4 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	22 900	15,5	421 000	18,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	9 600	47,6	156 900	53,2
25-34 ans	4 700	18,3 *	123 900	27,6
35-44 ans	4 500	14,7 *	81 100	17,2
45 ans et plus	4 400	6,0 *	59 200	5,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Proportion brute des hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception, RLS de Lanaudière, 2008 (%)



Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	11 700	19,1	15 500	18,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	4 200	54,1 *	8 900	71,8
25-34 ans	4 700	44,2 *	4 400	29,0 *
35-44 ans	2 200	17,6 **	1 700	9,5 **
45 ans et plus	700	2,0 **	1 000	2,4 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

Proportion brute des hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)



Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	27 200	18,6	476 200	20,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	13 000	64,9	171 800	58,3
25-34 ans	9 100	35,2	167 100	37,3
35-44 ans	4 000	12,8 *	89 600	19,0
45 ans et plus	1 700	2,3 **	47 500	4,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	15 400	12,7	17 300	10,3
Hommes	8 300	12,9 *	8 700	10,6 *
Femmes	7 100	12,4	8 600	9,9
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	6 600	43,1 *	10 000	40,7
25-34 ans	1 800	8,5 **	2 500	7,9 **
35-44 ans	3 100	12,7 *	1 900	5,0 **
45 ans et plus	3 700	5,5 *	3 000	4,0 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	32 700	11,2	658 300	13,9
Hommes	17 000	11,5	367 200	15,4
Femmes	15 600	10,8	291 100	12,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	16 600	41,7	250 100	41,0
25-34 ans	4 300	8,1 *	154 500	17,1
35-44 ans	5 000	8,1 *	120 800	12,9
45 ans et plus	6 600	4,7 *	123 900	5,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



CONSOMMATION  
DE DROGUES



Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	80 000	50,0	103 700	47,7
Hommes	46 200	56,2	60 200	55,4
Femmes	33 900	43,7	43 600	40,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	14 700	63,6	22 100	62,7
25-34 ans	16 800	77,1	20 500	61,7
35-44 ans	15 900	60,4	23 700	60,3
45 ans et plus	32 200	35,5	37 000	37,9

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	183 700	48,6	2 702 100	44,5
Hommes	106 400	55,6	1 514 400	49,8
Femmes	77 500	41,6	1 188 900	39,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	36 800	63,1	525 000	57,4
25-34 ans	37 200	67,8	629 800	64,4
35-44 ans	39 600	60,4	521 400	51,6
45 ans et plus	69 200	36,7	1 005 000	32,9

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	77 100	48,3	100 300	46,3
Hommes	44 300	54,2	58 400	53,9
Femmes	32 700	42,4	42 100	38,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	14 000	60,5	21 800	61,9
25-34 ans	16 400	75,7	20 400	61,5
35-44 ans	15 300	58,2	22 900	58,1
45 ans et plus	30 900	34,0	35 200	36,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	177 400	47,1	2 600 400	43,2
Hommes	102 700	54,0	1 465 000	48,4
Femmes	74 800	40,3	1 137 300	38,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	35 800	61,3	516 800	56,5
25-34 ans	36 900	67,2	618 300	63,2
35-44 ans	38 100	58,2	506 300	50,1
45 ans et plus	66 200	35,1	949 000	31,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé de la cocaïne ou du crack au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	18 900	11,9	22 900	10,5
Hommes	12 200	15,1	17 300	15,8
Femmes	6 700	8,7 *	5 700	5,2 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	2 700	11,8 **	4 300	12,1 **
25-34 ans	4 000	18,4 *	3 800	11,3 **
35-44 ans	5 100	19,3 *	8 200	20,9 *
45 ans et plus	7 000	7,7 *	6 600	6,8 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ayant consommé de la cocaïne ou du crack au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	41 800	11,1	627 100	10,4
Hommes	29 500	15,5	422 200	13,8
Femmes	12 400	6,7	206 000	6,9
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	7 000	12,0 *	80 100	8,8
25-34 ans	7 800	14,1 *	170 000	17,4
35-44 ans	13 300	20,3	159 000	15,8
45 ans et plus	13 600	7,2	213 500	7,0

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant consommé des amphétamines au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	13 000	8,2	18 300	8,2
Hommes	8 200	10,1 *	11 700	10,5
Femmes	4 800	6,3 *	6 600	6,0 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	5 300	22,9 *	7 600	21,6 *
25-34 ans	3 200	14,7 *	3 800	11,4 **
35-44 ans	900	3,6 **	3 400	8,7 **
45 ans et plus	3 400	3,7 *	3 300	3,4 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé des amphétamines au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	31 200	8,2	428 800	7,1
Hommes	19 900	10,4	264 900	8,6
Femmes	11 300	6,1	164 500	5,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	12 900	22,1	130 500	14,3
25-34 ans	7 000	12,7 *	144 300	14,8
35-44 ans	4 300	6,6 **	48 800	4,8
45 ans et plus	6 700	3,5 *	99 700	3,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	22 000	14,1	26 700	11,9
Hommes	13 000	16,3	17 100	15,2
Femmes	9 000	11,9	9 600	8,6 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	9 200	39,6	11 700	33,3
25-34 ans	5 400	25,0 *	7 000	21,1 *
35-44 ans	2 900	11,1 *	3 500	8,8 **
45 ans et plus	4 100	4,5 *	4 100	4,2 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	48 700	12,8	777 500	12,7
Hommes	30 100	15,6	509 300	16,5
Femmes	18 600	10,0	269 100	8,9
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	20 900	35,8	314 900	34,4
25-34 ans	12 400	22,6	223 900	22,9
35-44 ans	6 400	9,7 *	99 200	9,8
45 ans et plus	8 200	4,4 *	124 000	4,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	21 000	13,6	24 900	11,2
Hommes	12 400	15,6	16 000	14,4
Femmes	8 700	11,7	8 900	8,1 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	9 100	39,4	11 700	33,3
25-34 ans	5 300	24,5 *	6 900	20,8 *
35-44 ans	2 800	10,7 *	2 900	7,4 **
45 ans et plus	3 600	3,9 *	3 400	3,4 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	45 900	12,2	724 300	12,0
Hommes	28 400	14,8	478 700	15,6
Femmes	17 600	9,6	247 100	8,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	20 900	35,8	303 800	33,2
25-34 ans	12 200	22,2	214 100	21,9
35-44 ans	5 700	8,7 *	88 900	8,8
45 ans et plus	6 900	3,7 *	111 100	3,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



ÉTAT DE SANTÉ



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	17 900	10,6	16 300	8,7
Hommes	10 100	12,0	7 200	7,9 *
Femmes	7 800	9,3	9 100	9,4
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	34 200	9,6	649 700	11,0
Hommes	17 300	9,9	290 700	10,2
Femmes	16 900	9,4	358 700	11,7
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	1 500	2,6 **	51 700	5,7
25-44 ans	5 100	4,2 *	123 400	6,2
45-64 ans	15 900	11,7	272 400	13,0
65 ans et plus	12 000	22,8	209 800	21,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SITUATION  
FINANCIÈRE



Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	20 700	12,7	14 500	7,2
Hommes	7 900	9,6	5 800	5,8 *
Femmes	12 800	15,9	8 700	8,6
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	3 000	12,8 **	3 100	8,8 **
25-44 ans	5 600	11,6 *	5 400	7,4 *
45-64 ans	8 600	13,8	3 600	4,9 *
65 ans et plus	3 600	12,7 *	2 500	10,3 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	35 200	9,7	660 400	11,1
Hommes	13 700	7,6	313 500	10,6
Femmes	21 400	11,8	346 900	11,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	6 100	10,4 *	74 800	8,2
25-44 ans	10 900	9,1	221 800	11,2
45-64 ans	12 200	9,0	248 000	11,9
65 ans et plus	6 100	11,6	116 800	12,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



TENSION ARTÉRIELLE

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	129 600	84,2	158 900	83,0
Hommes	62 500	80,8	77 000	80,0
Femmes	67 200	87,7	81 800	86,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
18-24 ans	11 300	74,8	12 500	58,4
25-44 ans	35 800	74,6	55 900	77,1
45-64 ans	56 200	90,2	67 300	91,4
65 ans et plus	26 500	92,9	22 700	94,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	288 600	83,6	4 673 800	83,2
Hommes	139 500	80,3	2 260 300	81,9
Femmes	149 000	86,8	2 412 400	84,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
18-24 ans	23 900	65,5	381 500	66,9
25-44 ans	91 600	76,1	1 539 300	77,4
45-64 ans	123 500	90,9	1 841 700	88,2
65 ans et plus	49 200	93,8	911 100	94,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)


	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	100 300	84,4	119 700	84,0
Hommes	45 800	81,1	53 200	80,7
Femmes	54 500	87,4	66 300	86,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
18-24 ans	7 700	74,3	8 200	61,3
25-44 ans	23 900	72,2	37 600	75,9
45-64 ans	44 500	90,3	52 900	92,0
65 ans et plus	24 500	93,4	21 100	95,4


Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	219 900	84,2	3 537 100	83,4
Hommes	99 000	80,9	1 574 000	82,7
Femmes	120 800	87,1	1 961 100	84,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
18-24 ans	15 900	66,9	272 100	68,0
25-44 ans	61 500	74,4	1 029 600	76,1
45-64 ans	97 400	91,2	1 424 700	87,7
65 ans et plus	45 600	94,3	823 400	94,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.


Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



RHINITE ALLERGIQUE  
ET HERBE À POUX

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	25 300	15,8	40 100	19,0
Hommes	11 700	14,4	17 700	17,0
Femmes	13 600	17,2	22 300	21,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	3 700	15,9 *	6 700	18,9 *
25-44 ans	9 100	18,9	15 500	21,4
45-64 ans	10 900	17,5	14 900	20,2
65 ans et plus	1 600	5,5 **	2 900	12,2 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	65 300	17,5	998 200	16,7
Hommes	29 400	15,7	448 500	15,1
Femmes	35 900	19,4	549 900	18,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	10 300	17,7 *	158 100	17,3
25-44 ans	24 600	20,4	415 300	20,9
45-64 ans	25 800	19,0	334 700	16,0
65 ans et plus	4 500	8,6 *	89 400	9,2

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	10 600	35,5	15 500	34,1
Hommes	5 100	34,2 *	7 700	38,2 *
Femmes	5 500	35,3 *	7 900	31,1 *
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Info centre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	26 200	35,0	495 800	42,6
Hommes	12 800	37,4	205 700	38,7
Femmes	13 300	33,1	290 100	45,7
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	3 000	24,9 **	59 300	33,4
25-44 ans	10 400	41,3	211 400	46,2
45-64 ans	11 100	39,1	176 800	45,7
65 ans et plus	1 600	21,4 **	47 900	37,5

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	12 900	8,0	21 000	10,0
Hommes	5 800	7,2 *	10 700	10,3 *
Femmes	7 100	8,8	10 300	9,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	1 600	6,7 **	2 000	5,6 **
25-44 ans	4 500	9,3 *	9 500	13,1 *
45-64 ans	6 100	9,8 *	7 800	10,5 *
65 ans et plus	800	2,7 **	1 700	7,3 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	33 900	9,1	505 500	8,5
Hommes	16 500	8,8	221 900	7,5
Femmes	17 400	9,4	283 600	9,5
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	3 500	6,0 **	70 000	7,7
25-44 ans	14 000	11,6	215 900	10,9
45-64 ans	13 900	10,2	175 800	8,4
65 ans et plus	2 500	4,8 *	43 800	4,5

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Info centre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SANTÉ  
BUCCODENTAIRE



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire  
selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	17 000	10,3	19 500	9,5
Hommes	9 100	10,8	11 500	11,1 *
Femmes	7 900	9,7	8 100	7,8 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	1 300	5,7 **	1 600	4,6 **
25-44 ans	4 600	9,6 *	7 000	9,6 *
45-64 ans	7 800	12,5	9 100	12,4
65 ans et plus	3 300	11,4 *	1 800	7,4 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	36 500	9,9	701 600	11,8
Hommes	20 600	11,1	393 900	13,5
Femmes	15 900	8,7	308 100	10,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	2 900	5,0 **	94 600	10,3
25-44 ans	11 600	9,6 *	214 000	10,8
45-64 ans	16 900	12,4	265 700	12,7
65 ans et plus	5 000	9,5 *	128 300	13,3

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	23 100	13,5	21 200	12,4
Hommes	9 500	11,0	9 700	12,0
Femmes	13 600	15,8	11 400	12,8
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


■ Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>3</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	44 300	12,9	650 800	11,2
Hommes	19 200	11,4	250 100	9,4
Femmes	25 000	14,2	400 000	12,8
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.


np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	117 700	72,8	164 000	79,3
Hommes	50 200	61,2	71 900	69,2
Femmes	67 500	84,6	91 900	88,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	17 600	75,9	31 300	88,7
25-44 ans	36 100	75,3	59 700	82,3
45-64 ans	46 200	74,0	56 200	76,3
65 ans et plus	17 600	61,8	16 900	70,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	281 800	76,5	4 702 600	78,8
Hommes	122 200	65,7	2 044 700	69,0
Femmes	159 400	87,0	2 654 800	88,1
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	48 800	83,6	764 500	83,5
25-44 ans	95 800	79,5	1 634 500	82,2
45-64 ans	102 400	75,3	1 606 100	76,9
65 ans et plus	34 600	65,9	692 300	71,5

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population âgée de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise  
la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	44 100	31,4	59 200	32,4
Hommes	16 300	22,2	20 600	22,7
Femmes	27 800	41,4	38 400	42,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	6 100	26,3 *	10 500	29,8 *
25-44 ans	13 500	28,4	21 300	29,4
45-64 ans	20 200	38,6	23 200	37,0
65 ans et plus	4 200	27,0	4 100	30,5 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	103 300	31,9	1 759 100	33,6
Hommes	36 900	22,3	666 600	24,8
Femmes	66 200	41,8	1 089 700	42,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	16 600	28,4	245 400	27,0
25-44 ans	34 800	29,0	590 400	29,9
45-64 ans	43 300	37,7	701 300	38,6
65 ans et plus	8 300	28,7	217 300	37,0

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SANTÉ  
MENTALE



**Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	9 000	5,5	11 500	5,6
Hommes	5 400	6,6 *	5 100	5,0 *
Femmes	3 600	4,3 *	6 300	6,2 *
	Population estimée	Proportion brute	Population estimée	Proportion brute
15-24 ans	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np
45-64 ans	np	np	np	np
65 ans et plus	np	np	np	np

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	20 400	5,6	389 400	6,5
Hommes	10 500	5,7	176 500	5,9
Femmes	9 900	5,4	212 700	7,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	2 200	3,8 **	34 200	3,7 *
25-44 ans	6 100	5,1 *	144 300	7,3
45-64 ans	8 600	6,3	156 500	7,5
65 ans et plus	3 500	6,6 *	53 700	5,5

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	37 000	23,0	40 000	19,5
Hommes	15 800	19,5	13 500	12,7
Femmes	21 100	26,5	26 500	25,8
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	6 200	27,0 *	9 700	27,6 *
25-44 ans	12 500	26,0	11 400	15,7 *
45-64 ans	11 600	18,6	14 700	19,9
65 ans et plus	6 600	23,1	4 200	17,7 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique  
selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	77 000	21,0	1 325 000	22,2
Hommes	29 300	15,8	539 500	18,2
Femmes	47 600	26,0	784 200	26,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	16 000	27,4	221 200	24,2
25-44 ans	23 900	19,8	487 900	24,5
45-64 ans	26 200	19,3	430 900	20,6
65 ans et plus	10 800	20,6	180 700	18,7

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	19 600	12,7	16 400	8,3
Hommes	11 800	14,7	8 800	8,9 *
Femmes	7 900	10,5	7 600	7,7 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	2 100	9,5 **	1 900	5,6 **
25-44 ans	7 400	16,7	6 500	9,5 *
45-64 ans	8 300	13,8	6 900	9,8 *
65 ans et plus	1 700	5,9 **	900	4,1 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	36 000	10,2	579 200	10,2
Hommes	20 600	11,5	281 600	9,9
Femmes	15 400	8,9	297 500	10,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	4 000	7,1 **	75 900	8,6
25-44 ans	14 000	12,3	205 200	10,9
45-64 ans	15 200	11,6	245 900	12,4
65 ans et plus	2 600	5,1 *	48 700	5,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	7 700	4,7 *	8 000	3,9 *
Hommes	2 200	2,7 **	2 800	2,7 **
Femmes	5 500	6,9 *	5 300	5,1 *
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	1 300	5,7 **	1 100	3,2 **
25-44 ans	3 400	7,1 *	3 500	4,8 **
45-64 ans	2 400	3,8 *	2 600	3,5 **
65 ans et plus	500	1,7 **	900	3,7 **

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	15 700	4,3	266 300	4,5
Hommes	4 900	2,7 *	106 000	3,6
Femmes	10 800	5,9	160 000	5,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	2 400	4,2 **	35 400	3,8
25-44 ans	6 900	5,7 *	105 000	5,3
45-64 ans	4 900	3,6 *	100 300	4,8
65 ans et plus	1 400	2,6 **	24 100	2,5

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.


Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



STATUT PONDÉRAL ET  
ACTIONS ENTREPRISES  
CONCERNANT  
SON POIDS

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	62 900	38,4	85 200	42,0
Hommes	30 400	36,5	39 700	38,5
Femmes	32 500	40,4	45 500	45,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	2 500	11,0 **	6 500	18,7 *
25-44 ans	17 900	38,2	29 400	41,9
45-64 ans	31 700	50,8	38 700	52,5
65 ans et plus	10 800	38,0	10 600	44,1

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	148 200	40,5	2 265 200	38,3
Hommes	70 100	37,7	1 072 900	36,5
Femmes	78 000	43,2	1 191 900	40,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	9 000	15,6 *	150 800	16,6
25-44 ans	47 300	40,4	722 600	37,4
45-64 ans	70 400	51,7	1 017 200	48,7
65 ans et plus	21 400	40,8	373 800	38,6

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	28 300	17,2	44 400	21,4
Hommes	11 600	14,0	16 500	16,5
Femmes	16 700	20,6	27 800	26,4
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
15-24 ans	3 000	12,9 **	6 000	17,0 *
25-44 ans	7 200	15,0	16 300	22,5
45-64 ans	14 800	23,8	17 600	23,9
65 ans et plus	3 200	11,4 *	4 500	18,6 *

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion ajustée <sup>2</sup>
Total	72 700	19,6	1 109 500	18,5
Hommes	28 100	15,4	447 000	15,1
Femmes	44 500	24,0	661 500	22,0
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
15-24 ans	9 000	15,4 *	132 700	14,5
25-44 ans	23 500	19,5	404 900	20,4
45-64 ans	32 400	23,8	435 300	20,9
65 ans et plus	7 700	14,7	133 400	13,8

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
Total	83 700	55,0	108 100	57,2
Hommes	50 900	65,8	67 000	69,6
Femmes	32 700	43,6	41 000	44,3
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>
18-24 ans	4 100	27,8 *	8 100	38,2 *
25-44 ans	25 200	53,7	38 600	55,1
45-54 ans	18 900	56,2	26 200	59,2
55-64 ans	18 200	63,2	20 600	70,0
65 ans et plus	17 500	61,3	14 600	60,9

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

	Lanaudière		Reste du Québec <sup>4</sup>	
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
Total	191 900	56,2	2 893 600	52,1
Hommes	118 000	67,9	1 712 100	62,0
Femmes	73 800	44,0	1 178 200	42,2
	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>3</sup>	Population estimée <sup>1</sup>	Proportion brute
18-24 ans	12 200	34,0	148 400	26,4
25-44 ans	63 800	54,5	960 300	49,7
45-54 ans	45 100	57,9	671 600	57,4
55-64 ans	38 700	66,6	564 600	61,6
65 ans et plus	32 000	61,1	551 000	56,9

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

- 1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.
- 2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.
- 3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.
- 4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CAMIRAND, Hélène, Francine BERNÈCHE, Linda CAZALE, Renée DUFOUR, Jimmy BAULNE et autres. *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*, Québec, Institut de la statistique de Québec, 2010, 205 p.

TRAORÉ, Issouf, Hélène CAMIRAND et Jimmy BAULNE. *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : analyse des données régionales. Recueil statistique*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010, 878 p.







**Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Lanaudière**

**Québec** 